

ETS	Que se observa	¿Cómo se contrae esta enfermedad?	¿Qué ocurre si usted no recibe tratamiento?
Clamidia o uretritis no específica	<ul style="list-style-type: none"> La clamidia afecta a las mujeres. En los hombres, la clamidia puede causar uretritis no específica. Los síntomas aparecen entre los 7 y 28 días después de tener relaciones sexuales. La mayoría de las mujeres y algunos hombres no presentan síntomas. <p>Mujeres:</p> <ul style="list-style-type: none"> Desecho vaginal. Pérdida de sangre por la vagina entre menstruaciones. Ardor o dolor al orinar. Necesidad de orinar más seguido. Dolor en el abdomen (estómago) a veces acompañado de fiebre y de náuseas. <p>Hombres:</p> <ul style="list-style-type: none"> Gotas de líquido blanco que salen por el pene. Ardor o dolor al orinar. Necesidad de orinar más seguido. Dolor o hinchazón de los testículos. 	<ul style="list-style-type: none"> Se transmite durante las relaciones sexuales, ya sea por la vagina o por el ano y también durante el sexo oral (chupar o mamar) con alguien que tenga clamidia. 	<ul style="list-style-type: none"> Usted puede transmitir la clamidia a su(s) pareja(s). Puede causar infecciones más serias. También puede causar daño a los órganos reproductores. Las mujeres y posiblemente los hombres podrían quedar estériles (sin poder tener hijos). Una madre que tiene la clamidia puede contagiar a su bebé durante el parto.
Verrugas Genitales	<ul style="list-style-type: none"> Los síntomas aparecen entre 1 y 8 meses después de haber estado en contacto con el HPV, el virus que causa las verrugas genitales. Otro tipo de HPV está relacionado con el cáncer cervical en las mujeres. Se observan pequeñas verrugas en los órganos sexuales y el ano. Se nota ardor y comezón alrededor de los órganos sexuales. Después que las verrugas desaparecen, el virus a veces permanece en el cuerpo. Las verrugas pueden aparecer nuevamente. 	<ul style="list-style-type: none"> Se transmite durante el sexo vaginal, anal y oral, y veces por tocar los órganos genitales de alguien que tiene las verrugas. 	<ul style="list-style-type: none"> Usted puede transmitir las verrugas genitales a su(s) pareja(s). Las verrugas pueden desaparecer solas, o permanecer sin cambios, o crecer y extenderse. Una madre que tiene verrugas contagiar a su bebé durante el parto.
Gonorrea	<ul style="list-style-type: none"> Los síntomas aparecen entre los 2 y 21 días después de tener relaciones sexuales. La mayoría de las mujeres y algunos hombres no presentan síntomas. <p>Mujeres:</p> <ul style="list-style-type: none"> Secreción espesa amarilla o grisácea por la vagina. Ardor o dolor al orinar o al defecar. Regla anormal o pérdida de sangre vaginal entre menstruaciones. Calambres y dolor en la parte baja del abdomen (belly). <p>Hombres:</p> <ul style="list-style-type: none"> Líquido espeso amarillo o verdusco que sale por el pene. Ardor o dolor al orinar o al mover el vientre. Necesidad de orinar más seguido. Testículos hinchados o doloridos. 	<ul style="list-style-type: none"> Se transmite durante las relaciones sexuales, ya sea por la vagina o por el ano y también durante el sexo oral (chupar o mamar) con alguien que tenga gonorrea. 	<ul style="list-style-type: none"> Usted puede transmitir la gonorrea a su(s) pareja(s). Puede causar infecciones más serias. También puede causar daño a los órganos reproductores. Tanto hombre como mujeres pueden quedar estériles (sin poder tener hijos). Una madre con gonorrea se la puede pasar a su bebé en el útero o en el parto. Puede causar daños al corazón, enfermedades de la piel, artritis o ceguera.
Hepatitis B	<ul style="list-style-type: none"> Los síntomas aparecen entre 1 y 9 meses después de tener contacto con el virus causante de la hepatitis B. Muchas personas no presentan síntomas o estos son leves. Sensación como de gripe que no desaparece. Cansancio. Ictericia (la piel se pone amarilla). Orina de color oscuro, excremento de color claro. 	<ul style="list-style-type: none"> Se transmite durante las relaciones sexuales, ya sea por la vagina o por el ano y también durante el sexo oral (chupar o mamar) con alguien que tenga hepatitis B. Se transmite al compartir jeringas para inyectarse drogas, o cualquier sustancia. Se transmite al contacto con sangre infectada. 	<ul style="list-style-type: none"> Usted puede transmitir la hepatitis B a su(s) pareja(s) o a alguien con quien comparta jeringas. Algunas personas se recuperan completamente. Algunas personas no se pueden curar. Los síntomas desaparecen pero todavía pueden contagiar a otras personas. Puede causar daños permanentes o cáncer al hígado. Una madre que tiene hepatitis B puede contagiar a su bebé durante el parto.
Herpes	<ul style="list-style-type: none"> Los síntomas aparecen entre 1 y 30 días (o más) después de tener relaciones sexuales. Algunas personas no presentan síntomas. Sensación como de gripe. Pequeñas y dolorosas ampollas en los órganos sexuales y en la boca. Comezón o ardor antes que aparezcan las ampollas. Las ampollas duran de 1 a 3 semanas. Las ampollas desaparecen, pero uno todavía tiene herpes. Las ampollas pueden aparecer nuevamente. 	<ul style="list-style-type: none"> Se transmite durante las relaciones sexuales, ya sea por la vagina o por el ano y también durante el sexo oral (chupar o mamar) con alguien que tenga herpes. A veces se transmite por tocar los órganos genitales. 	<ul style="list-style-type: none"> Usted puede transmitir herpes a su(s) pareja(s). El herpes no se cura. Una madre que tiene herpes puede contagiar a su bebé durante el parto.
VIH/SIDA	<ul style="list-style-type: none"> Los síntomas aparecen varios meses o varios años después del contacto con el VIH, el virus que causa el SIDA. Puede estar presente por muchos años sin que se vean síntomas. Pérdida de peso sin razón aparente o cansancio. Sensación como de gripe que no desaparece. Diarrea. Manchas blancas en la boca. En las mujeres, hongos vaginales que no desaparecen. 	<ul style="list-style-type: none"> Se transmite durante las relaciones sexuales, ya sea por la vagina o por el ano y también durante el sexo oral (chupar o mamar) con alguien que tenga VIH. Se transmite al compartir jeringas para inyectarse drogas, o cualquier sustancia. Se transmite al contacto con sangre infectada. 	<ul style="list-style-type: none"> Usted puede transmitir el VIH a su(s) pareja(s) o a alguien con quien comparta jeringas. El VIH no se puede curar. Puede causar enfermedad y muerte. Una madre que tiene VIH puede contagiar a su bebé todavía estando en la matriz, durante el parto o al amamantar a su bebé.
Si filis	<p>Primera etapa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Los síntomas aparecen entre 1 y 12 semanas después de tener relaciones sexuales. Aparecen una o más llagas en la boca o en los órganos sexuales, que no causan dolor. Las llagas duran de 1 a 5 semanas. Las llagas desaparecen pero uno todavía tiene sífilis. <p>Segunda etapa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Los síntomas aparecen de 1 semana a 6 meses después que la/s llaga/s desaparecieron. Aparece un sarpullido en cualquier parte del cuerpo. Sensación como de gripe. El sarpullido y la sensación como de gripe desaparecen, pero uno todavía tiene sífilis. 	<ul style="list-style-type: none"> Se transmite durante las relaciones sexuales, ya sea por la vagina o por el ano y también durante el sexo oral (chupar o mamar) con alguien que tenga sífilis. 	<ul style="list-style-type: none"> Usted puede transmitir sífilis a su(s) pareja(s). Una madre que tiene sífilis puede contagiar a su bebé durante embarazo o perder el bebé. Puede causar daños al corazón o al cerebro, ceguera y muerte.
Triconomiasis o uretritis no específica	<ul style="list-style-type: none"> Afecta tanto a hombres como a mujeres. En los hombres, puede causar uretritis no específica. Los síntomas aparecen entre 3 y 14 días después del acto sexual. Muchas personas no tienen síntomas. <p>Mujeres:</p> <ul style="list-style-type: none"> Comezón, ardor o irritación en la vagina. Flujo vaginal de color amarillento, verdusco o gris. <p>Hombres:</p> <ul style="list-style-type: none"> Gotas de líquido blanco que salen por el pene. Ardor o dolor al orinar. Necesidad de orinar más seguido. 	<ul style="list-style-type: none"> Se transmite durante el acto sexual vaginal. 	<ul style="list-style-type: none"> Usted puede transmitir la triconomiasis a su(s) pareja(s). Los síntomas inco modos continuara n. Los hombres pueden tener infecciones en la próstata.